WIESENGRÜN SAATGUTMISCHUNGEN

Saatgutmischungen bieten höhere Ertragssicherheit als Einzelkomponenten und vermindern Erosionen.

SAATZEIT VON VEGETATIONSBEGINN BIS ENDE AUGUST

Die Anfangsentwicklung von Nachsaaten und Neuansaaten wird durch eine frühe erste Nutzung oder gegebenenfalls durch Reinigungsschnitt, welche Verunkrautungsdruck mindern und Bestockung der Gräser fördern, begünstigt.

SAATGUTMISCHUNG		ANBAULAGE	NUTZUNGSEIGNUNG			
			GRÜNFUTTER	WEIDE	SILAGE	HEU
ST 1	Landsberger Gemenge (auch als bio erhältlich)	für alle Lagen	✔	✔	✔	(✔)
ST 2	Böschungsmischung zur Futternutzung	für alle Lagen	✔	(✔)	✔	✔
ST 3	Mischung für Schweinekoppel für steirische Verhältnisse	für alle Lagen		✔		
ST 6	Kleegrasmischung für zwei bis drei Hauptnutzungsjahre	für milde und mittlere Lagen	✔		✔	(✔)
ST 6 BIO	Kleegrasmischung Bio bio für zwei bis drei Hauptnutzungsjahre	für milde und mittlere Lagen	✔		✔	(✔)
ST 9	Dauerwiesenmischung für mittelintensive Bewirtschaftung ohne Goldhafer (bis zu drei Nutzungen/Jahr)	für kalzinosegefährdete Lagen	✔	(✔)	✔	✔
ST 13	Kleegrasmischung für zwei bis drei Hauptnutzungsjahre	für raue Lagen	✔		✔	(✔)
ST 13 BIO	Kleegrasmischung Bio bio für zwei bis drei Hauptnutzungsjahre	für raue Lagen	✔		✔	(✔)
ST 16	Vielgrasmischung für Zwischenfruchtanbau überjährig in nicht zu rauen Lagen	für alle Lagen	✔	✔	✔	✔
ST 18 BIO	Luzerne-Rotkleegrasmischung Bio bio Schrittmachergemenge für zwei bis drei Hauptnutzungsjahre	für trockene und mittlere Lagen	✔		✔	(✔)
ST 19 BIO	Nachsaatmischung Bio für Dauerwiese, Dauerweide bio oder Feldfutterbau bei mittelintensiver Bewirtschaftung	für mittlere Lagen	✔	✔	✔	✔
ST 4	Mulchmischung für intensive Obstlagen	für alle Lagen				

✔= geeignet (✔) = bedingt geeignet

SAATGUT AUSTRIA

Geprüft vom Bundesamt für Ernährungssicherheit gemäß dem österreichischen Mischungsrahmen.
Ausnahmen sind die Saatgutmischungen ST 6 Bio, ST 13 Bio, ST 18 Bio und ST 19 Bio.

KOMPONENTEN DER SAATGUTMISCHUNG	SONSTIGE MISCHUNGEN			DAUERGRÜNLAND	FELDFUTTERBAU		
	ST 1	ST 2	ST 3	ST 9	ST 6	ST 6 BIO	ST 13
Rotklee				✔	✔	✔	✔
Weißklee		✔	✔	✔	✔	✔	✔
Schwedenklee			✔				
Hornklee		✔		✔			
Esparsette		✔					
Winterwicke	✔						
Inkarnatklee	✔						
Glatthafer							
Knaulgras		✔		✔	✔	✔	✔
Timothe		✔		✔	✔	✔	✔
Wiesenschwingel		✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ital. Raygras	✔	✔			✔	✔	
Engl. Raygras		✔	✔	✔	✔	✔	✔
Bastardraygras	✔				✔	✔	✔
Goldhafer							
Rotschwingel		✔		✔			
Rotes Straußgras				✔			
Wiesenrispe		✔	✔	✔			
Aussaatmenge kg/ha	**60 – 80**	**80 –120**	**30**	**30**	**25**	**25**	**25**

KOMPONENTEN DER SAATGUTMISCHUNG	FELDFUTTERBAU			NACHSAAT	SPEZIAL MISCHUNGEN
	ST 13 BIO	ST 16	ST 18 BIO	ST 19 BIO	ST 4
Rotklee	✔		✔	✔	
Weißklee	✔		✔	✔	✔
Hornklee					✔
Gelbklee					
Luzerne			✔		
Persischer Klee		✔			
Knaulgras	✔				✔
Timothe	✔		✔	✔	✔
Wiesenschwingel	✔		✔	✔	✔
Ital. Raygras		✔*			
Engl. Raygras	✔		✔	✔	
Bastardraygras	✔				
Kammgras					✔
Rotschwingel				✔	✔
Ausläuferrotschwingel					
Horstrotschwingel					
Rohrschwingel					
Schafschwingel					
Härtlicher Schwingel					
Rotes Straußgras					✔
Wiesenrispe					✔
Aussaatmenge kg/ha	**25**	**40**	**30**	**Nachsaat: 25 – 30 Übersaat: 15 – 20**	**30**

✔= in der Saatgutmischung enthaltene Kulturart
* 1 diploide Sorte und 2 tetraploide Sorten Ital. Raygras

Vorbehalten Änderungen der Rezepturen.